



Analyses d'urines : Mode d'emploi

Attention, le tube bouchon vert contient un milieu de transport qui peut irriter la peau les yeux ou les muqueuses. En cas de contact, rincer abondamment avec de l'eau.

Recueillir les urines de préférence le matin au lever (sinon 4h après la dernière fois que vous avez uriné si votre état le permet)

Ne prenez aucun médicament antibiotique avant le recueil (sinon le signaler)

Pour les femmes : éviter la période des règles (ou alors utiliser un tampon)




Lavez-vous les mains. Procédez à une **toilette intime** soignée au savon suivie d'un rinçage. Si utilisation d'une lingette, veillez à n'effectuer qu'un seul passage



Dévissez le couvercle du pot et posez-le sur une surface plane

Ne pas toucher la canule



Éliminez le 1^{er} jet d'urines dans les toilettes

Recueillez ensuite les urines de façon à remplir le pot à moitié




Remplacez le couvercle (bien visser)

Retirez l'étiquette de protection (ne pas la jeter)




Poussez le tube bouchon **beige** dans l'orifice de transfert. Attendez la fin du remplissage puis passez au tube bouchon **vert**. Remplacez l'étiquette de protection et videz dans les toilettes l'urine restant dans le pot



Retournez 5 fois les tubes

Indiquez sur chaque tube Nom Prénom et date de naissance




Placez les tubes pleins et le pot vide* dans le sachet double poche.

Complétez le formulaire au dos de cette feuille

Insérez ce formulaire et l'ordonnance dans la pochette externe du sachet

Après le recueil, maintenir les tubes à **température ambiante (ne pas réfrigérer)**

*ou éliminer le pot dans la filière DASRI



Apportez le sachet au laboratoire ou déposez-le dans un point de collecte.

À transmettre le plus rapidement possible
Délai recommandé < 8h
Délai acceptable < 24h

Délai acceptable < 48h uniquement si ECBU avec recueil sur tube bouchon vert

	Avant le recueil	Quand effectuer le recueil ?	Quels flacons utiliser ?	Puis	Comment recueillir les urines ?	Remarques
ECBU		Voir notice ci-dessus			Voir notice ci-dessus	
Chimie urinaire		Voir notice ci-dessus			Environ 50 ml d'urine	Voir notice ci-dessus
Antigénurie						Urines fraîches recueillies au laboratoire
Drogue		Recueil au laboratoire				
Urines de 24h	Bien s'hydrater avant et pendant le recueil. Le matin, au lever, vider la vessie dans les toilettes. Noter la date et l'heure sur l'étiquette du flacon. Recueillir, dans le flacon, toutes les urines des mictions suivantes.				Le jour suivant, aller aux toilettes à l'heure notée sur l'étiquette et recueillir les dernières urines. Conserver les urines à 4° pendant la durée du recueil	
Chlamydia	Pas de toilette intime	1 ^{ère} miction du matin ou à plus de 3h de la miction précédente			Faible volume (10 à 20 ml) du 1 ^{er} jet d'urines	Chez la femme, en dépistage, auto-prélèvement vaginal recommandé
Gonocoque				Laisser les urines dans le flacon au bouchon jaune (ne pas utiliser les tubes)	Environ 100 ml d'urine	Recueillir les urines en fin de miction
Mycoplasmes	Effectuer un effort physique	Entre 10h et 14h			Environ 50 ml	Recueil au laboratoire (Epinal Saut le Cerf) recommandé
Bilharziose		1 ^{ères} urines du matin			Éliminer le 1 ^{er} jet dans les toilettes	Alternative : urines de fin de 1 ^{ère} miction du matin
Cristallurie	Toilette locale	2 ^{ème} miction du matin, après avoir bu et marché 30min				
Frottis urinaire		1 ^{ères} urines du matin			Totalité des urines de la miction	A effectuer 3 jours consécutifs (conserver à 4°). Transmettre le flacon au laboratoire après chaque recueil.
Mycobactéries -BK	Boire peu avant le coucher et ne pas boire durant la nuit					
Hématies Leucocytes	3h avant l'heure habituelle du lever, boire ½ L d'eau, vider votre vessie dans les toilettes	Au lever, 3h après avoir bu				
Minute HLM						
Compte d'Addis						